

PIPP - Premature Infant Pain Profile (B. Stevens, 1996)

Profil bolesti nezralého novorozence

Jméno dítěte:

Datum/čas:

Výkon:

Postup	Indikátor	0	1	2	3	Skóre
	Gestační věk	36. týden	32.-35. týden	28.-31. týden	< 28. týden	
Sledujte dítě 15 vteřin před výkonem Sledujte srdeční akci sat O₂	Chování	Aktivní/ probuzený otevřené oči, pohyb obličeje	Tichý/ probuzený otevřené oči, bez pohybu obličeje	Aktivní/ spí zavřené oči, pohyb obličeje	Tichý/ spí zavřené oči, bez pohybu obličeje	
Sledujte dítě po zákroku 30 vteřin	Srdeční akce max:	Minutový nárůst 0-4 tepů	5-14 tepů	15-24 tepů	25 a více	

Sat O₂	Snížení 0-2,4 %	2,5-4,9 %	5-7,4 %	7,5 % a více	
Svraštění čela	žádné	minimální	střední	maximální	
Stisknutí očí	žádné	minimální	střední	maximální	
Nazolabiální rýha	žádná	minimální	střední	maximální	

Celkové skóre:

Skóre menší než 6 = slabá bolest, větší než 12 = silnější bolest

Postup:

1. Určete gestační věk dítěte v době pozorování, zapište skóre
2. Sledujte chování dítěte 15 vteřin před výkonem a zapište skóre
3. Zapište srdeční frekvenci a saturaci O₂ před výkonem
4. Proveďte výkon
5. Sledujte chování dítěte ihned po výkonu po dobu 30 vteřin
6. Zapište změny v chování a změny srdeční akce a saturace
7. Sečtěte celkové skóre