

VYLUČOVÁNÍ A VÝMĚNA - GASTROINTESTINÁLNÍ FUNKCE

Název klinického pracoviště:

Iniciály klienta:

Pohlaví: muž žena

Lékařská/é diagnóza/y:

Den hospitalizace:

Oslovení klienta:

Věk:

Pooperační den:

Stav vyprazdňování stolice klienta

pravidelné nepravidelné

denní doba: přibližně stále stejná různá

frekvence defekace: 1krát denně 2krát denně 3krát denně

více než 3krát denně ob den 1krát za 3 dny méně než 2krát týdně

defekace v noci: ne ano: výjimečně občas často

změny ve vyprazdňování stolice v poslední době: ne ano, jaké:

Rituály/návyky podporující defekaci:

pravidelná denní doba obklady na břicho masáž pití jídlo

úprava stravy úprava příjmu tekutin projímavé minerální soli

rehabilitace volně prodejná léčiva: jiné:

prostředí k vyprazdňování uzpůsobeno: není je: madla jiné:

Vzhled stolice makroskopický

množství stolice: přiměřené málo obsažné objemné

konzistence stolice: měkká formovaná tvrdá skybala

kašovitá vodnatá s lemem zpěněná

tvár stolice: stužkovitá bobkovitá sekaná jiný:

barva stolice: hnědá mrkvová žlutá černá zelená

acholická (bílo šedá, světlá) melena (tmavá, dehtovitá)

enterorhagia (s jasně červenou krví) steatorea (našedlá)

zápach stolice: hnilobný kyselý nasládlý

patologické příměsi ve stolici: hlen hnis parazité cizí těleso

nestrávené zbytky potravy

krev: makroskopická okultní

enterorhagia meléna krvácení předstírané/falešné

jiné změny vzhledu:

Související problémy u klienta

změny tělesné hmotnosti dietní chyba dietní omezení

snížení příjmu tekutin nechutenství nevolnost zvracení bolest

únava imobilita změny barvy kůže perianální intertrigo

poruchy svalového tonu poruchy inervace psychické poruchy

jiné:

choroby ovlivňující složení stolice a defekace:

léky ovlivňující složení stolice a defekaci:

způsoby léčby ovlivňující defekaci:

kontrastní látka v GIT celková anestezie operace v dutině břišní

enterální výživa parenterální výživa stomie píštěle

úrazy/poranění jiné:

Způsoby vyprazdňování stolice klienta

sám na WC s doprovodem na WC s dopomocí při hygieně

Alternativní způsoby vyprazdňování stolice:

pojízdný klozet podložní mísa pleny

jiná pomůcka/postup usnadňující vyprazdňování stolice:

rektální rourka teploměr klyzma

pomůcky ke zvládnutí inkontinence:

Problémy s vyprazdňováním stolice

obstipace pseudoobstipace skybala paradoxní průjem

diarrhoea tenesmus

incontinentia alvi: celková částečná fixovaná

Subjektivní obtíže při defekaci:

bolestivé vyprazdňování pocit svědění pocity tlaku

naléhavá defekace otálení s defekací

vnímání pocitu nucení na defekaci: oslabení vymizení zesílení

Problémy související se střevní činností:

flatulence meteorismus borborygmy dolní dyspeptický syndrom

peristaltika: zrychlená zpomalená vymizelá

hemeroidy: zevní vnitřní

Specifické způsoby vyprazdňování stolice

Stomie: ne ano, typ: ileostomie cekostomie

stomie v colon ascendens stomie v colon transversum

stomie v colon descendens sigmoideostomie

Charakter vzhledu stomie:

popis úrovně ústí k okolí: v úrovni zanořená prolaps

barva/prokrvení stomie: růžová bledá cyanóza hyperemie

velikost stomie: přiměřená otok atrofie

tvár stomie: stálý změněný, jak:

celistvost stomie: zachována porušena: ragády poranění

jiné:

stav kůže kolem stomie: normální macerovaná suchá

krvácení ze stomie: ne ano

bolest v místě stomie: ne ano

bolest v okolí stomie: ne ano

charakteristika sekrece ze stomie:

střevní obsah: přiměřený změněný, jak:

jiná sekrece:

konzistence střevního obsahu: tekutý kašovitý formovaný

množství za 24 hodin v ml:

barva střevního obsahu: hnědá žlutá zelená jiná:

zápach: kyselý hnilobný nasládlý

frekvence vyprazdňování střevního obsahu: nepřetržité vyprazdňování

vyprazdňování v intervalech: nepravidelných pravidelných

možnost ovlivnění frekvence: ne ano

příměsi: hlen hnis zbytky potravy

krev: okultně makroskopicky čerstvá natrávená

jiné:

úroveň sebedpěče o stomii: klient samostatný

potřeba dopomoci, v čem:

potřeba péče